

VORICONAZOL

GRUPO FARMACOLOGICO: Antimicóticos. J02AC.

PRESENTACIÓN:

Vfend vial de 200 mg.

RECONSTITUCIÓN:

Reconstituir el vial con 19 ml de agua p.i. Se recomienda usar una jeringa de 20 ml para medir exactamente los 19 ml de agua p.i. Agitar hasta completa disolución. La concentración obtenida será de 10 mg/ml.

Estabilidad del vial reconstituido 24 horas en nevera (+2°C a +8°C). Debido a que no tiene conservantes se recomienda administrar inmediatamente.

ADMINISTRACIÓN

INYECCIÓN IV DIRECTA: NO

INFUSIÓN INTERMITENTE: SI

Diluir la dosis prescrita en 100-250 ml de SF o SG5%. (La concentración final de la solución de perfusión debe ser de 2 mg/ml a 5 mg/ml de voriconazol). Administrar en 1 a 2 horas

Notas:

-En caso necesario puede diluirse en más volumen de líquido de perfusión hasta concentraciones de 0,5 mg/ml de voriconazol.

INFUSIÓN CONTÍNUA: NO.

INYECCIÓN IM: NO.

SUEROS COMPATIBLES: SF, SG5%. Incompatible con soluciones de bicarbonato sódico.

OBSERVACIONES:

-Dosis usual del primer día de tratamiento de 6 mg/Kg cada 12 h durante 24 horas y dosis usual de mantenimiento en días sucesivos 4 mg/Kg cada 12 horas.

-También está disponible vía oral

(Ficha Mayo 2003, según Ficha 11 Junio 2001).